Thema: Kurvendiskussion. Wendestellen und Tangenten

Arbeitsblatt: Lambacher Schweizer Analysis

[reset() // Entleert sämtliche Speicher

[assume(Type::Real) // Definiert die Definitionsmenge über reelle
[$\mathbb{R}$ ✓

Aufgabe 2)
f)

[f:=x->1/10*x^5-4/3*x^3+6*x // Definition einer Funktion mit der Variable "x"
[$x \rightarrow \frac{x^5}{10} - \frac{4 \cdot x^3}{3} + 6 \cdot x$ ✓ 2/2

1. Schritt: Ableitungen

[f'
[$x \rightarrow \frac{x^4}{2} - 4 \cdot x^2 + 6$

[f''
[$x \rightarrow 2 \cdot x^3 - 8 \cdot x$

[f'''
[$x \rightarrow 6 \cdot x^2 - 8$

2. Schritt: Symmetrie

[bool(f(x)=f(-x)) // Achsensymmetrie zur Y-Achse ✓
[FALSE

[bool(f(-x)=-f(x)) // Punktsymmetrie zum Ursprung ✓
[TRUE

Die Funktion besitzt nur ungerade Exponenten, daher ergibt sich eine Punktsymmetrie zum Ursprung. ✓ 2/2

3. Schritt: Nullstellen

[solve(f(x)=0,x) // Schnitte mit der x-Achse ✓
[{0}

x_0_1=0

NST bei (0 | 0).

4. Schritt: Schnitt mit der y-Achse:

```
[ f(0)
  0
```

Der y-Achsenabschnitt liegt bei $y=0$ und dementsprechend auf dem Ursprung.

5. Schritt: Verhalten für $|x| \rightarrow$ unendlich / "Globales Verhalten"

```
[ limit(f(x), x=+infinity)
  ∞
```

```
[ limit(f(x), x=-infinity)
  -∞
```

Schlussfolgerung

6. Schritt: Extremstellen

```
[ solve(f'(x)=0, x) // Notwendige Bedingung für Extrema
  {-√2, -√6, √2, √6}
```

```
[ float(solve(f'(x)=0, x))
```

```
[ {-2.449489743, -1.414213562, 1.414213562, 2.449489743}
```

Mögliche Extremstellen

$x_{e_1} = -2.449$

$x_{e_2} = -1.414$

$x_{e_3} = +1.414$

$x_{e_4} = +2.449$

Bestimmen, ob ein Hochpunkt (HP), ein Tiefpunkt (TP) oder ein Sattelpunkt (SP) vorliegt:
Hinreichende Bedingung für Extrema:

1. Vorgehensweise:

$x_{e_1} = -2.449$

```
[ f'(-2.8)
  5.3728
```

```
[ f'(-2.3)
  -1.16795
```

VZW von + zu - $\rightarrow$ Hochpunkt (HP) an der Stelle $x_{e_1} = -2.449$.

$x_{e_2} = -1.414$

```
[ f'(-1.5)
  -0.46875
```

$$\begin{bmatrix} f'(-1.3) \\ 0.66805 \end{bmatrix}$$

VZW von - zu + -> Tiefpunkt (TP) an der Stelle $x_{e_2} = -1.414$.

$$x_{e_3} = +1.414$$

$$\begin{bmatrix} f'(1.3) \\ 0.66805 \\ f'(1.5) \\ -0.46875 \end{bmatrix}$$

VZW von + zu - -> Hochpunkt (HP) an der Stelle $x_{e_3} = +1.414$.

$$x_{e_4} = 2.449$$

$$\begin{bmatrix} f'(2.3) \\ -1.16795 \\ f'(2.6) \\ 1.8088 \end{bmatrix}$$

VZW von - zu + -> Tiefpunkt (TP) an der Stelle $x_{e_4} = 2.449$.

2. Vorgehensweise

$$x_{e_1} = -2.449$$

$$\begin{bmatrix} f''(-2.449) \\ -9.784249698 \end{bmatrix}$$

$$x_{e_2} = -1.414$$

$$\begin{bmatrix} f''(-1.414) \\ 5.657708112 \end{bmatrix}$$

$$x_{e_3} = +1.414$$

$$\begin{bmatrix} f''(+1.414) \\ -5.657708112 \end{bmatrix}$$

$$x_{e_4} = +2.449$$

$$\begin{bmatrix} f''(2.449) \\ 9.784249698 \end{bmatrix}$$

$f''(x) < 0$ (negativ) -> HP an den Stellen $x_{e_1} = -2.449$ und $x_{e_3} = +1.414$.
 $f''(x) > 0$ (positiv) -> TP an den Stellen $x_{e_2} = -1.414$ und $x_{e_4} = +2.449$.

 "Lokal" oder "Global":

Im Vergleich mit dem 5. Schritt: Verhalten für $|x| \rightarrow \infty$ / "Globales Verhalten" kann es keine globalen Extrema geben, da der Funktionsgraph sowohl ins negativ als auch in das positiv unendliche strebt.

Daher sind alle gefundenen **Extrema lokal**.

Ermitteln der jeweiligen y-Werte der Extremstellen:

$$\begin{bmatrix} f(-2.449) \\ -3.919184763 \end{bmatrix}$$

HP bei (-2.449 | -3.919)

$$\begin{bmatrix} f(-1.414) \\ -5.279730504 \end{bmatrix}$$

TP bei (-1.414 | -5.279)

$$\begin{bmatrix} f(1.414) \\ 5.279730504 \end{bmatrix}$$

HP bei (+1.414 | 5.279)

$$\begin{bmatrix} f(2.449) \\ 3.919184763 \end{bmatrix}$$

TP bei (2.449 | 3.919)

6/6

7. Schritt: Wendestellen

$$\begin{bmatrix} \text{solve}(f''(x)=0, x) \text{ // Notwendige Bedingung für Wendestellen} \\ \{-2, 0, 2\} \end{bmatrix}$$

Mögliche Wendestellen bei $x_{w_1} = -2$, $x_{w_2} = 0$, $x_{w_3} = 2$

Bestimmen, ob WP oder SP vorliegt:
Hinreichende Bedingung für Wendestellen:

1. Vorgehensweise:

$$\begin{bmatrix} x_{w_1} = -2 \\ f''(-2.1) \\ -1.722 \\ f''(-1.9) \\ 1.482 \end{bmatrix}$$

VZW der zweiten Ableitung von - zu + $\rightarrow$ WP mit Rechts-Links-Krümmung an der Stelle $x_{w_1} = -2$.

$\checkmark$ α

$$\begin{bmatrix} x_{w_2} = 0 \\ f''(-0.1) \\ 0.798 \\ f''(0.1) \\ -0.798 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0.798 \end{bmatrix}$$

VZW der zweiten Ableitung von + zu - -> WP mit Links-Rechts-Krümmung an der Stelle $x_{w_2} = 0$.

$$x_{w_3} = 2$$

$$\begin{bmatrix} f''(1.9) \\ -1.482 \\ f''(2.1) \\ 1.722 \end{bmatrix}$$

0,5

VZW der zweiten Ableitung von - zu + -> WP mit Rechts-Links-Krümmung an der Stelle $x_{w_3} = 2$.

2. Vorgehensweise:

111

$$x_{w_1} = -2$$

$$\begin{bmatrix} f'''(-2) \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$x_{w_2} = 0$$

$$\begin{bmatrix} f'''(0) \\ -8 \end{bmatrix}$$

$$x_{w_3} = +2$$

$$\begin{bmatrix} f'''(2) \\ 16 \end{bmatrix}$$

$f''(x) > 0$ (positiv) -> TP der ersten Ableitung -> WP mit Rechts-Links-Krümmung an den Stellen $x_{w_1} = -2$ und $x_{w_3} = +2$.

0,5

$f''(x) < 0$ (negativ) -> HP der ersten Ableitung -> WP mit Links-Rechts-Krümmung an der Stelle $x_{w_2} = 0$.

0,5
111

Ermitteln der jeweiligen y-Werte der Wendestellen:

$$\begin{bmatrix} f(-2) \\ -\frac{68}{15} \end{bmatrix}$$

WP1 bei $(-2 \mid -68/15)$

0,5

$$\begin{bmatrix} \text{float}(f(-2)) \\ -4.533333333 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{float}(-68/15) \\ -4.533333333 \end{bmatrix}$$

WP1 bei (ca. -2 | ca. -4,53)

0,5

$$\begin{bmatrix} f(0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

[0

WP2 bei (0 | 0)

[f(2)
68
15

[float(68/15)
4.533333333

WP3 bei (2 | ca. 4.53)

1/1
4/4

8. Schritt: Monotonie- Intervalle:

Aus 6. Schritt: Ermitteln der Extrempunkte folgt mit

$x_{e_1} = -2.449 \Rightarrow$ HP (VZW in f' von + zu -)

$x_{e_2} = -1.414 \Rightarrow$ TP (VZW in f' von - zu +)

$x_{e_3} = +1.414 \Rightarrow$ HP (VZW in f' von + zu -)

$x_{e_4} = +2.449 \Rightarrow$ TP (VZW in f' von - zu +),

dass es insgesamt fünf verschiedene Monotonieintervalle geben muss:

I: $(-\infty; -2.449)$: G_f streng monoton steigend ($f'(x) > 0 \Leftrightarrow f'$ positiv)

II: $(-2.449; -1.414)$: G_f streng monoton fallend ($f'(x) < 0 \Leftrightarrow f'$ negativ)

III: $(-1.414; +1.414)$: G_f streng monoton steigen ($f'(x) > 0 \Leftrightarrow f'$ positiv)

IV: $(+1.414; +2.449)$: G_f streng monoton fallend ($f'(x) < 0 \Leftrightarrow f'$ negativ)

V: $(+2.449; +\infty)$: G_f streng monoton steigend ($f'(x) > 0 \Leftrightarrow f'$ positiv)

2/2

9. Schritt: Wendetangente

Wir wissen:

WP1 mit Rechts-Links-Krümmung an der Stelle $x_{w_1} = -2$ mit $(-2 | -68/15)$.

WP2 mit Links-Rechts-Krümmung an der Stelle $x_{w_2} = 0$ mit $(0 | 0)$.

WP3 mit Rechts-Links-Krümmung an der Stelle $x_{w_3} = 2$ mit $(2 | +68/15)$.

Für die Tangentengleichung benötigen wir:

*Steigung m

*Y-Achsenabschnitt b:

[m:=f'(-2)

-2

[m:=f'(0)

6

[m:=f'(2)

-2

[b:=solve(f'(-2)*-2+b=-68/15,b)

{ -128/15 }

$$\left\{ -\frac{128}{15} \right\}$$

$$h := \text{solve}(f'(0) \cdot 0 + h = 0, h)$$

$$\{0\}$$

$$g := \text{solve}(f'(2) \cdot 2 + g = 68/15, g)$$

$$\left\{ \frac{128}{15} \right\}$$

Daraus folgen die Tangentenfunktionsgleichungen:

$$t := x \rightarrow m \cdot x + b$$

$$x \rightarrow m \cdot x + b$$

mit

$$t_{w_1} := x \rightarrow -2 \cdot x - 128/15$$

$$x \rightarrow -2 \cdot x - \frac{128}{15}$$

$$t_{w_2} := x \rightarrow 0 \cdot x + 0 \quad 6$$

$$x \rightarrow 0 \cdot x + 0$$

$$t_{w_3} := x \rightarrow -2 \cdot x + 128/15$$

$$x \rightarrow \frac{128}{15} - 2 \cdot x$$

10. Schritt: Zeichnung des Graphen (f , f' , f'' , f''' und Wendetangenten t_{w_1} , t_{w_2} , t_{w_3})

`plotfunc2d(f(x), f'(x), f''(x), f'''(x), t_w_1(x), t_w_2(x), t_w_3(x), x=-5..5,`

Blue	$1/10 \cdot x^5 - 4/3 \cdot x^3 + 6 \cdot x$
Red	$1/2 \cdot x^4 - 4 \cdot x^2 + 6$
Green	$2 \cdot x^3 - 8 \cdot x$
Yellow	$6 \cdot x^2 - 8$
Orange	$-2 \cdot x - 128/15$
Cyan	0
Magenta	$128/15 - 2 \cdot x$